

# ZUDICORT<sup>®</sup> Cream

(Fusidic Acid BP + Betamethasone Valerate BP)

**COMPOSITION:** Each gram cream contains:

Fusidic Acid BP ..... 20mg.  
Betamethasone Valerate BP equivalent to Betamethasone ... 1mg.  
NQ Specs.

**PROPERTIES:** Zudicort Cream is combination of potent topical antibacterial action of Fusidic acid and anti inflammatory and antipruritic effects of Betamethasone. Betamethasone is a topical corticosteroids with rapid effect in inflammatory skin diseases and even unmanageable and relapsing conditions of skin diseases are usually treated successfully with Betamethasone. Application of Fusidic acid is effective against Staphylococci, Streptococci, Corynebacteria, Neisseria and certain Clostridia and Bacteroides. The antibacterial activity of Fusidic acid is not diminished in the presence of Betamethasone.

**INDICATIONS:** Zudicort cream is indicated in inflammatory skin diseases associated with bacterial infection or likely to occur. Eczematous dermatoses (inflammatory skin diseases) includes atopic eczema, discoid eczema, stasis eczema, seborrheic dermatitis, contact dermatitis, lichen simplex chronicus, psoriasis, discoid lupus erythematosus.

**DOSAGE:** A small quantity should be applied to the affected area twice daily until a satisfactory response is obtained. A single treatment course should not normally exceed 2 weeks. In the more resistant lesions the effect of Zudicort Cream can be enhanced by occlusion with polythene film. Overnight occlusion is usually adequate.

**CONTRA-INDICATIONS:** Prior known hypersensitivity with any component of Zudicort cream. As all the topical corticosteroids are contra-indicated in viral, tuberculous and fungal skin infections, perioral dermatitis, acne rosacea and ulcerative conditions.

**PRECAUTIONS:** Prolong and continuous therapy of Zudicort cream should be avoided particularly on face, flexure muscles and intertriginous areas and in infants and children. Extensive topical use of Zudicort cream should be avoided during pregnancy. Use of Zudicort cream should be avoided in infants and children. Use Zudicort cream cautiously when applying near the eye because in some patients Zudicort can increase intraocular pressure which may lead to Glaucoma if entered in eye.

**WARNING:** For external use only. Use under medical advise, Zudicort cream should not be used in patients who are sensitive with any of its active or inactive ingredients.

**ADVERSE EFFECTS:** Zudicort cream is tolerable for topical use and hypersensitivity reactions are noted rarely. Like other topical corticosteroids prolonged and intensive treatment may cause local atrophic changes of the skin such as striae, thinning and dilatation of the superficial blood vessels, especially when occlusive dressing is used or when skin folds are involved. Systemic absorption, sufficient to produce hypercorticism/ adrenal suppression can occur with prolonged or extensive use, especially when used under occlusion/napkin.

**INSTRUCTIONS:** Store below 30°C. Protect from heat and light. Keep out of the reach of children. **FOR EXTERNAL USE ONLY.**

**PRESENTATION:** Zudicort cream is available in tube of 5g and 15g.



**Manufactured by:**  
**NABIQASIM INDUSTRIES (PVT.) LTD.**  
17/24, Korangi Industrial Area, Karachi-Pakistan.

Rev: 07-21/4

## زیوڈیکورٹ کریم

(فیوسیدک ایسڈ + پیناسیتھاسون ویلیئرینٹ)

اجزاء ترکیب : زیوڈیکورٹ کریم کے ہر گرام میں مندرجہ ذیل اجزاء شامل ہیں۔

فیوسیدک ایسڈ ۰.۰۵ فی گرام + پیناسیتھاسون ویلیئرینٹ ۱ فی گرام

خصوصیات : زیوڈیکورٹ کریم میں فیوسیدک ایسڈ جو کرائشی بکٹریاں تھیررکتی ہے اور پیناسیتھاسون شامل ہے جو کوسوز اور خارش کے لئے مؤثر ہے۔ کریم میں موجود فیوسیدک ایسڈ جلد کے انفیکشن جو Staphylococci, Neisseria, Corynebacteria, Streptococci اور کچھ مخصوص Bacteroides اور Clostridia کی وجہ سے ہوں ایسے جلد کے انفیکشنز کے لئے ایک مؤثر دوا ہے۔ علامات : زیوڈیکورٹ ان تمام جلد کی بیماریوں میں مؤثر ہے جو بکٹریاں انفیکشنز کے ساتھ ساتھ کوسوز اور خارش کی حامل ہوں مثلاً مختلف اقسام کے Psoriasis, Eczema اور پمپل وغیرہ اور کسی چیز سے انتہائی حساسیت کی وجہ سے جلد کے انفیکشنز میں ایک کارآمد دوا ہے۔

طریقہ استعمال : دوا کی مناسب مقدار متاثرہ حصے پر دن میں دو دفعہ لگائیں جب تک مطلوبہ اطمینان بخش نتائج حاصل نہ ہوں۔ تاہم علاج کا دورانیہ دو ہفتے سے طویل نہ ہو زیوڈیکورٹ کریم سے ضمنی زخم کے علاج کے دوران دوا کی تھیراپی کو مزید بہتر کرنے کے لئے زخم کو پولی ٹھین فلم سے پوری رات کے لئے ڈھانپ دیں۔

ممنوع علامات : زیوڈیکورٹ کریم میں موجود کسی بڑے پیٹنگی حساسیت Viral, Tuberculous, Fungal skin infections اور Acne rosacea اور Ulcerative conditions میں زیوڈیکورٹ کا استعمال ممنوع ہے۔

احتیاط : زیوڈیکورٹ کے لیے عرصے تک استعمال سے گریز کرنا چاہئے۔ خاص طور پر جب اس کا استعمال چہرے پر ہو۔ اس کے علاوہ flexure اور Intertriginous areas نو مولود اور شیرخوار بچوں میں اس کے استعمال سے گریز کرنا چاہئے۔ حاملہ خواتین میں طویل عرصے تک استعمال سے گریز کرنا چاہئے۔ زیوڈیکورٹ کریم کا استعمال بچوں میں نہایت احتیاط سے کریں۔ دوا چہرے پر لگاتے وقت انتہائی احتیاط کریں اور آنکھوں کو بچائیں۔ دوا کے آنکھوں میں داخل ہونے سے Glaucoma کا خطرہ ہو سکتا ہے۔

ٹاپیکل کورٹیکوسٹیروائڈ حساسات : زیوڈیکورٹ ایک بے ضرر دوا ہے اور Hypersensitivity reactions کے واقعات شاذ و نادر ہی علم میں آتے ہیں۔ بیرونی جلد پر استعمال ہونے والے Corticosteroid کے لیے عرصے تک اور زیادہ استعمال سے جلد میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ مثلاً جلد کا سکڑنا، جلد کا باریک ہو جانا، خون کی بالائی نالیوں کا پھیل جانا، خاص طور پر جب متاثرہ حصے پر Dressing بھیجی جا رہی ہو یا Skin folds متاثر ہوں۔ اگر کریم کا استعمال طویل عرصے سے اور وسیع جگہ پر ہو تو بھی وہی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جو دوا کے کھانے سے ہوتے ہیں۔

ہدایات : ۳۰ ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت پر رکھیں۔ گرمی اور روشنی سے بچائیں۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ صرف بیرونی استعمال کیلئے

طریقہ فراہمی : زیوڈیکورٹ کریم ۵ گرام اور ۱۵ گرام کی ٹیوب میں دستیاب ہے۔

تیار کنندگان : منی قاسم انڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۲۴/۱ اکورنگی انڈسٹریل ایریا کراچی۔ پاکستان۔



Rev: 07-21/4